

BRAVECTO[®]
PLUS

12 SEMANAS
DE PROTECCIÓN

UNA PROTECCIÓN SEGURA*, EFICAZ Y TAN ÚNICA COMO LOS GATOS



* Seguro en gatos a partir de las 9 semanas de edad y de 1,2 kg de peso. No se recomienda el tratamiento de machos reproductores ni durante la gestación y/o la lactancia. Lleve guantes cuando maneje o administre el medicamento.

 **MSD**
Animal Health

LOS PARÁSITOS EN LOS GATOS


Los principales parásitos externos e internos que afectan a los gatos están presentes todo el año en España y las enfermedades que transmiten representan un riesgo tanto para el gato como para su familia.^{1,2,3}

Estos parásitos afectan a gatos *indoor* y *outdoor*, por ello es necesario proteger a todos los gatos durante todo el año.^{4,5}

LA OPORTUNIDAD EN LA CLÍNICA VETERINARIA


La población de gatos crece un 54 % desde 2019, llegando a 5,85 millones de gatos.⁶

Crece el número de pacientes felinos y el importe medio por visita*




*Barómetro sectorial clínicas veterinarias 2021 VMS

Crece el mercado de antiparasitarios externos para gatos a un ritmo superior comparado con el mercado de los antiparasitarios para perros**



**Estudio VMS TAM Q3 2021

¿CÓMO PROTEGEN LAS FAMILIAS A SUS GATOS?^{5,7}





12 SEMANAS
DE PROTECCIÓN



BRAVECTO® PLUS



PROTECCIÓN TRIMESTRAL
FRENTE A PULGAS,
GARRAPATAS Y
ÁCAROS DEL OÍDO

PLUS



FLURALANER
Parásitos externos



PULGAS



GARRAPATAS



ÁCAROS DEL OÍDO
Otodectes cynotis



AMPLIO ESPECTRO

MOXIDECTINA
Parásitos internos



**FILARIOSIS
CARDIOPULMONAR**



ANCILOSTOMAS



ASCÁRIDOS

¿POR QUÉ BRAVECTO® PLUS ES ÚNICO?

1 MENOR
NÚMERO
DE APLICACIONES

2 MENOS
ESTRÉS PARA
EL GATO

3 MAYOR
ADHERENCIA
AL TRATAMIENTO

EN UN ESTUDIO QUE INVOLUCRÓ 671 CLÍNICAS VETERINARIAS Y 41.630 GATOS,
BRAVECTO® PLUS HA DEMOSTRADO SER EL ANTIPARASITARIO
QUE FACILITA UNA MEJOR ADHERENCIA AL TRATAMIENTO⁸

MENOS
ESTRÉS.
MÁS
PROTECCIÓN:



BRAVECTO® PLUS
mejora la adherencia
al tratamiento para una vida
más saludable.



BRAVECTO® PLUS
es eficaz frente a los parásitos
que pueden transmitirse
a LAS PERSONAS.



BRAVECTO® PLUS
interrumpe el ciclo biológico de
las pulgas y contribuye al control
del ambiente: hogar protegido.

SIGUIENDO LAS RECOMENDACIONES DE LOS EXPERTOS: GUÍAS ESCCAP⁹

● Guía 1, Página 10

“Para reducir el riesgo de excreción de huevos de *Toxocara* y *Taenia*, realizar análisis coprológicos al menos 4 veces al año y tratar según sea necesario, o desparasitar frente a ascáridos y cestodos*, al menos 4 veces al año.”

● Guía 1, Página 26

“Si la frecuencia de los tratamientos antihelmínticos se incrementa, aumenta la presión de selección sobre los **parásitos resistentes**.”

● Guía Modular 1.7, Página 20

“La infección por *Dipylidium caninum* se puede evitar **controlando la infestación por pulgas**.”

El intervalo de administración de **BRAVECTO® PLUS** respeta las recomendaciones de las **guías ESCCAP⁹**

*La infección por *Taenia taeniaeformis* es habitual mientras que los gatos no suelen eliminar huevos de *E. multilocularis* en las heces, por lo que la infección por este parásito no tiene importancia epidemiológica.


UNA PROTECCIÓN RÁPIDA Y DURADERA

Bravecto® Plus proporciona una protección frente a los principales parásitos externos e internos del gato que es eficaz y de larga duración. Múltiples ensayos clínicos confirman que **Bravecto® Plus** brinda el control de parásitos que los gatos necesitan.^{10, 11, 12, 13}



PULGAS

Rompe el ciclo de la pulga en una sola dosis.¹⁴



La eficacia frente a pulgas fue al menos del 98,9 % en las 2, 4, 8 y 12 semanas después del tratamiento.


■ % reducción de pulgas en hogares ■ % hogares libres de pulgas ■ % gatos libres de pulgas

Bravecto® Plus puede utilizarse también como parte de una estrategia de control de la dermatitis alérgica por la picadura de pulgas (DAPP).



GARRAPATAS

Eficacia frente a garrapatas durante 12 semanas.²



La eficacia frente a garrapatas fue al menos del 97,2 % en las 2, 4, 8 y 12 semanas después del tratamiento

■ % reducción de garrapatas en hogares ■ % hogares libres de garrapatas ■ % gatos libres de garrapatas



ÁCAROS DEL OÍDO:

Otodectes cynotis


Los ácaros *Otodectes cynotis* son parásitos altamente contagiosos que producen la mayoría de los casos de otitis en gatos.

20 %

de prevalencia
de esta enfermedad¹⁵

50 %-80 %

de los casos de otitis están
producidos por *Otodectes*¹⁵



BRAVECTO® PLUS elimina *Otodectes cynotis* con una sola dosis. Sin ácaros visibles a los 14 días. 100 % de eficacia confirmada a los 28 días.¹⁵

PARÁSITOS GASTROINTESTINALES:



ASCÁRIDOS

Toxocara cati



ANCILOSTOMAS

Ancylostoma tubaeforme

98,3 % EFICACIA confirmada en condiciones de campo
(*Toxocara cati* y *Ancylostoma tubaeforme*: L4, adultos
inmaduros y adultos)¹⁰

DIROFILARIA

La dirofilariosis felina es una enfermedad silente y mortal con una prevalencia media en España de aproximadamente el 10 %.¹⁶




FRECUENTE

de curso hiperagudo,
con muerte súbita
en el 20 % de los casos¹⁶



DIFÍCIL

de diagnosticar¹⁶



SIN TRATAMIENTO

Solo la prevención es eficaz
para controlarla¹⁶



“ La mejor aproximación para la dirofilariosis felina es la prevención a través de la administración regular de productos que matan las larvas infestantes en la fase L3-L4”¹⁶

100 % DE EFICACIA A LAS
12 SEMANAS DE APLICAR
BRAVECTO® PLUS¹⁷



**BRAVECTO® PLUS: Única protección
trimestral frente a la dirofilariosis felina**

BRAVECTO[®] TE OFRECE:^{1, 8} **PLUS**

- ✓ **Protección trimestral frente a pulgas, garrapatas y ácaros del oído con un PLUS de protección frente a parásitos internos.**
- ✓ **Única protección trimestral frente a la dirofilariosis felina.**
- ✓ **Menos estresante para el gato debido a su aplicación trimestral.**
- ✓ **Mayor adherencia al tratamiento: la comodidad de una protección anual en solo 4 momentos.**

UNA INNOVADORA PIPETA “GIRAR Y APLICAR”

BRAVECTO[®] **PLUS** se presenta en una pipeta con un tapón giratorio para una aplicación fácil y sin complicaciones.

1



Retira el envoltorio y utiliza guantes adecuados mientras manejas pipetas.

2



Sujeta la pipeta por la base en posición vertical o por la parte rígida superior por debajo del tapón. Gira el tapón una vez para romper el sello.


RECUERDA: EL TAPÓN NO SE QUITA

3



El gato debe estar de pie o acostado con la espalda horizontal para facilitar la aplicación.
Coloca la punta de la pipeta sobre la base del cráneo del gato, separa el pelo y aplica el producto como se indica.

4



Si el gato pesa menos de 6,25 kg, aplicar en un único punto en la base del cráneo.
Si el gato pesa más de 6,25 kg, aplicar en dos puntos en la base del cráneo.
Hay más información disponible en el prospecto.



PRESENTACIONES:



Intervalo de peso	S	M	L
	1,2 - 2,8 kg	>2,8 - 6,25 kg	>6,25 - 12,5 kg*
Volumen (ml)	0,4	0,89	1,79
Fluralaner (mg)	112,5	250	500
Moxidectina (mg)	5,6	12,5	25

*Gatos >12,5 kg usar una combinación de 2 pipetas que se ajuste lo máximo posible a su peso corporal.

A PARTIR DE LAS 9 SEMANAS DE EDAD Y DE 1,2 kg DE PESO

BRAVECTO® SPOT-ON: PROTECCIÓN TRIMESTRAL FRENTE A PULGAS, GARRAPATAS Y ÁCAROS DEL OÍDO



Una sola dosis puede eliminar las pulgas del hogar¹⁸



12 semanas de protección frente a garrapatas



Elimina los ácaros del oído con una sola dosis



Y PARA UNA PROTECCIÓN MÁS COMPLETA:

PANACUR COMPRIMIDOS 250 Y PANACUR PASTA ORAL

- Indicado para infestación por nematodos gastrointestinales.
- Fácil administración.

Panacur pasta oral: presentación especialmente desarrollada para gatitos:

- 1 jeringa tratamiento completo para gatos de entre 1 y 6 kg de peso.
- Sin interacción con otros medicamentos.



BRAVECTO®

PLUS

BRAVECTO®

* Seguro en gatos a partir de las 9 semanas de edad y de 1,2 kg de peso. No se recomienda el tratamiento de machos reproductores ni durante la gestación y/o la lactancia. Lleve guantes cuando maneje o administre el medicamento.

BIBLIOGRAFÍA: **1.** Gálvez R, Montoya A, Checa R, Martín O, Marino V, Miró G. Flea species infesting dogs in Spain: updated spatial and seasonal distribution patterns. *Med Vet Entomol.* 2017 Mar;31(1):107-113. **2.** Estrada-Peña A, Roura X, Sainz A, Miró G, Solano-Gallego L. Species of ticks and carried pathogens in owned dogs in Spain: Results of a one-year national survey. *Ticks Tick Borne Dis.* 2017 Jun; 8(4):443-452. **3.** Morchón R, Carretón E, González-Miguel J, Mellado-Hernández I. Heartworm Disease (*Dirofilaria immitis*) and Their Vectors in Europe - New Distribution Trends. *Front Physiol.* 2012 Jun 12;3 :196. **4.** Montoya-Alonso, José Alberto et al. "First epidemiological report of feline heartworm infection in the Barcelona metropolitan area (Spain)." *Parasites & vectors* vol. 7 506. 12 Nov. 2014. doi:10.1186/s13071-014-0506-6. **5.** Beugnet, F., Bourdeau, P., Chalvet-Monfray, K. et al. Parasites of domestic owned cats in Europe: co-infestations and risk factors. *Parasites Vectors* 7, 291 (2014). **6.** Estudio Mascotas Veterindustria ANFAAC 2021 **7.** Encuesta online MSD AH Dic-18 5.658 entrevistas a dueños de gatos completadas. **8.** Robert Lavan, Rob Armstrong, Dorothy Normile & Wendy Vaala. Adherence to veterinary recommendations for ectoparasiticides purchased by cat owners in the USA, *Parasites & Vectors* volume 13, Article number: 541 (2020). **9.** ESCCAP. ESCCAP Guideline 01. 6th ed., 2021;5. ISBN: 978-1-913757-45-8. **10.** Bravecto Plus European Public Assessment Report. 2018. EMA/101041/2018. **11.** Bravecto Plus European Public Assessment Report. 2019. EMA/294408/2019. **12.** Blagburn B et al. American Association of Veterinary Parasitologists 65th Annual Meeting, 20-23 June 2020. Bravecto Plus European Public Assessment Report. 2020. EMA/626816/2019. **13.** Lavan RP et al. *J Vet Sci Technol.* 2017; 8:3. **14.** Rohdich et al. Field effectiveness and safety of fluralaner plus moxidectin (Bravecto® Plus) against ticks and fleas: a European randomized, blinded, multicenter field study in naturally-infested client-owned cats. *Parasite and Vectors.* 2018 Nov 19;11(1):598. **15.** Taenzler, J., de Vos, C., Roepke, R.K.A. et al. Efficacy of fluralaner plus moxidectin (Bravecto® Plus spot-on solution for cats) against *Otodectes cynotis* infestations in cats. *Parasites Vectors* 11, 595 (2018). **16.** Guidelines for clinical management of feline heartworm disease, European Society of *Dirofilariosis* and *Angiostrongylosis*. **17.** Blagburn B et al. American Association of Veterinary Parasitologists 65th Annual Meeting, 20-23 June 2020. Bravecto Plus European Public Assessment Report. 2020. EMA/626816/2019. **18.** Dryden et al. *Parasites & Vectors* (2018) 11:422.

Ficha técnica de
Bravecto Plus.



Ficha técnica de Bravecto
solución para unción
dorsal puntual para gatos.



Ficha técnica de Panacur
comprimidos 250 mg.



Ficha técnica de Panacur
pasta oral 187,5 mg/g.



 **MSD**
Animal Health

En caso de duda, consulte con su veterinario.